

# COVID-19 - VERWENDUNG VON PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat [Leitlinien](#) für eine rationale Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) in Gemeinden und Gesundheitseinrichtungen in Verbindung mit COVID-19 veröffentlicht. Präventions- und Eindämmungspraktiken sind der Schlüssel zur Verhinderung einer Übertragung. Verwenden, entfernen und entsorgen Sie nach einer angemessenen Auswahl, die PSA als eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme.

## Übertragungsrisiko



Nach bisherigen nachgewiesenen Erkenntnissen wird COVID-19 durch einen engen Kontakt mit und Tröpfchen von einer infizierten Person oder über eine kontaminierte Fläche übertragen.



Am meisten gefährdet sind Personen, die in einen engen Kontakt mit COVID-19-Patienten kommen oder diese pflegen.



Präventions- und Eindämmungsmaßnahmen sind der Schlüssel zur Verhinderung einer Übertragung.

## Präventionsmaßnahmen innerhalb der Gemeinde



Häufige Händereinigung mit Wasser und Seife oder einem alkoholbasierten Reinigungsmittel.




Vermeiden einer Berührung möglicher Infektionseintrittspunkte, wie Augen, Nase und Mund.



Reinigen der Atemwege durch Husten oder Niesen in den Ellbogen oder ein Papiertaschentuch, das danach umgehend entsorgt werden muss.



Tragen einer Maske bei Atemwegssymptomen und reinigen der Hände nach jedem Ausziehen der Maske.



Einhalten eines räumlichen Abstands von einem Meter von Menschen mit Atemwegssymptomen.

**Die WHO warnt vor einer exzessiven Verwendung von PSA, da diese sich negativ auf deren zukünftige Lieferbarkeit auswirken könnte. Die Einhaltung dieser Leitlinien soll eine rationale Verwendung von PSA und damit deren ständige Lieferbarkeit während dieses internationalen Notstands der öffentlichen Gesundheit sicherstellen.**

## Beschädigung oder Perforation von Schutzausrüstung

Im Fall einer perforierten oder beschädigten PSA muss der Träger seine Hände waschen und desinfizieren, die beschädigte PSA ausziehen, die Handreinigung wiederholen und neue PSA anziehen. Bei einem Kontakt mit Körperflüssigkeiten, wie einer Tröpfchenexposition von Augen oder Mund, müssen folgende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden:

- 1 Stellen Sie Ihre Tätigkeit umgehend ein.
- 2 Waschen und desinfizieren Sie die Hände.
- 3 Spülen Sie den betroffenen Bereich mit viel Wasser.
- 4 Befolgen Sie das für Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Gesundheitseinrichtung vorgeschriebene Meldeverfahren.

# COVID-19 - VERWENDUNG VON PERSÖNLICHER SCHUTZAUSRÜSTUNG

## Wann und wie soll man PSA verwenden

Die Verwendung der richtigen PSA ist abhängig von der Gefahr einer Exponierung, vom Umfeld sowie von der Art der Mitarbeiter und deren Tätigkeiten. Die nachstehende Tabelle auf Basis der WHO-Leitlinien beschreibt die richtige Verwendung von PSA in verschiedenen Einsatzbereichen. Lesen Sie für weitere Einzelheiten oder lokale Leitlinien bitte das vollständige Dokument.

| Anwender                        | Einsatzbereich   | Verwendung der richtigen PSA   |
|---------------------------------|--|--|
| Medizinisches Personal          | Voruntersuchung ohne direkten Kontakt  | Keine PSA erforderlich. Mindestabstand von einem Meter   |
|                                 | Körperliche Untersuchung von Patienten mit Atemwegssymptomen   | Medizinische Maske, Kittel, Handschuhe, Augenschutz*   |
|                                 | Direkte Pflege von COVID-19-Patienten  | Medizinische Maske, Kittel, Handschuhe, Augenschutz*   |
|                                 | Aerosol-produzierende Verfahren an COVID-19-Patienten  | N95- oder FFP2-Standard- oder gleichwertige Maske, Kittel, Handschuhe, Augenschutz, Schürze  |
|                                 | Direkte Hauspflege von COVID-19-Patienten  | Medizinische Maske, Kittel, Handschuhe, Augenschutz  |
|                                 | Transport von COVID-19-Verdachtsfällen in die Gesundheitseinrichtung                                   | Medizinische Maske, Kittel, Handschuhe, Augenschutz  |
| Patienten mit Atemwegssymptomen | Alle Bereiche einer stationären Einrichtung  | Mindestabstand von einem Meter Medizinische Maske (sofern toleriert)   |
|                                 | Untersuchungszimmer von ambulanten Patienten   | Medizinische Maske (sofern toleriert)  |
|                                 | Wartezimmer  | Medizinische Maske (sofern toleriert)<br>Transportieren Sie den Patienten umgehend in einen Isolationsraum oder einen von anderen Menschen weit abgelegenen Bereich. Ist das nicht möglich, muss ein Mindestabstand von einem Meter zu anderen Patienten eingehalten werden. |
|                                 | Heimpflege   | Mindestabstand von einem Meter Medizinische Maske (sofern toleriert), außer beim Schlafen  |
| Heimpfleger                     | Betreten des Patientenzimmers ohne Leistung einer direkten Pflege oder Hilfe                           | Medizinische Maske <sup>†</sup>  |
|                                 | Leistung einer direkten Pflege oder Entsorgung des Stuhls, Urins oder Abfalls eines COVID-19-Patienten | Handschuhe, medizinische Maske, Schürze (bei einer Gefahr von Spritzern)   |
| Reinigungspersonal              | Betreten des Zimmers eines COVID-19-Patienten  | Medizinische Maske, Kittel, schwere Handschuhe, Augenschutz (bei einer Gefährdung durch Spritzer von organischen Materialien oder Chemikalien), Stiefel oder Sicherheitsschuhe   |
|                                 | Betreten eines Zimmers nach und zwischen Untersuchungen von Patienten mit Atemwegssymptomen            | Medizinische Maske, Kittel, schwere Handschuhe, Augenschutz (bei einer Gefährdung durch Spritzer von organischen Materialien oder Chemikalien), Stiefel oder Sicherheitsschuhe   |
|                                 | Reinigen von Bereichen, in denen Menschen mit Fieber untersucht oder isoliert werden                   | Medizinische Maske, Kittel, schwere Handschuhe, Augenschutz (bei einer Gefährdung durch Spritzer von organischen Materialien oder Chemikalien), Stiefel oder Sicherheitsschuhe   |

\* Der empfohlene Augenschutz ist eine Schutzbrille oder ein Visier.<sup>†</sup> Aufgrund der weltweiten Knappheit von Gesichtsmasken werden immer wieder neue Empfehlungen gegeben. Der Leser sollte sich regelmäßig über die aktuellen Empfehlungen in seinem Land informieren.

**Ansell Healthcare Products LLC**

111 Wood Avenue, Suite 210  
Iselin, NJ 08830 USA

**Ansell Healthcare Europe NV**

Riverside Business Park  
Blvd International, 55,  
1070 Brussels, Belgium

**Ansell Limited**

Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australien

**Ansell Services Asia Sdn. Bhd.**

Prima 6, Prima Avenue,  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
63000 Cyberjaya, Malaysia

 [www.ansell.com](https://www.ansell.com)

Basierend auf den von der WHO am 27. Februar veröffentlichten Leitlinien unter [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE\\_use-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y)  
Ansell, ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. © 2020 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.